



Brasília, 11 de janeiro de 2021.

Leia atentamente a prova. A interpretação faz parte da mesma. As questões valem 0,25 pontos cada.

01. Assinale a alternativa correta:

- I. as pinças auxiliares anatômica e dente-de-rato são empregadas para preensão de pele e de musculatura, respectivamente.
 - II. desinfecção é a destruição da maioria dos microrganismos em objetos inanimados e a paramentação do cirurgião confere a ele a esterilização.
 - III. o ato de lavagem das mãos durante a paramentação do cirurgião é chamado de anti-sepsia.
 - IV. a pele do animal, após a anti-sepsia, é considerada estéril, para realização da cirurgia.
 - V. as pinças Allis são indicadas para preensão do estômago, sendo consideradas pinças especiais.
- a) I e II estão corretas
 - b) apenas III está correta
 - c) apenas V está incorreta
 - d) todas estão corretas
 - e) todas estão incorretas

02. O categut, o ácido poliglicólico e o algodão são respectivamente, fios: (assinale a alternativa correta)

- a) inabsorvível orgânico, inabsorvível multifilamentar, absorvível sintético;
- b) absorvível orgânico, absorvível de origem mineral, absorvível multifilamentar;
- c) absorvível inorgânico, sintético monofilamentado, inabsorvível sintético;
- d) absorvível orgânico, absorvível sintético, inabsorvível de origem vegetal;
- e) inabsorvível sintético, absorvível sintético, absorvível monofilamentado.

04. São condutas específicas para pacientes com trauma cranioencefálico:

- a. Utilizar furosemida.
- b. Elevar o paciente como um todo em 30 graus.
- c. Utilizar altas doses de corticóides.
- d. Induzir a hipotermia controlada.
- e. Utilizar manitol a 20% em bolus em 10 a 20 minutos, caso animal não esteja hipotenso.
- f. Utilizar solução hipertônica de cloreto de sódio a 7,5%.

- I. Todas as afirmativas estão corretas.
- II. Todas as afirmativas estão erradas.
- III. As afirmativas a, c e e estão corretas.
- IV. As afirmativas b, d, e e f estão corretas.
- V. As afirmativas a, b, e e f estão corretas.
- VI. As afirmativas a, b, c e e estão corretas.

05. Avalie o seguinte caso clínico: Cão da raça Yorkshire, 10 meses de idade, apresentando claudicação grau 2 no membro pélvico esquerdo e dor a palpação coxofemoral esquerda. Os exames radiográficos seriados evidenciaram as alterações ósseas reveladas nas imagens abaixo. Com base nesses dados, qual provável diagnóstico?



- a. Fratura do colo femoral esquerdo.
- b. Displasia coxofemoral esquerda.
- c. Necrose asséptica da cabeça do Fêmur esquerdo.
- d. Luxação coxofemoral esquerda.

06. Diversas doenças oftálmicas são comuns na rotina de atendimento clínico. Associe as colunas de acordo com o possível tratamento à doenças citadas na coluna da esquerda e depois assinale a alternativa correta:

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Conjuntivite Folicular | Antibioticoterapia e ceratoplastia |
| b. Cherry eye | II. Reposicionamento da glândula da terceira pálpebra |
| c. Entrópio | III. Imunossupressor |
| d. Triquíase | IV. Técnica de Stades |
| e. Obstrução do canal lacrimal | V. Anti-inflamatório não esteroidal |
| f. Ceratoconjuntivite seca | VI. Imunomoduladores |
| g. Ceratite ulcerativa | VII. Blefaroplastia |
| h. Sequestro de córnea | VIII. Reparo da puncta e dacriocistotomia |
| i. Uveíte | IX. Ceratectomia |

I.

- A. VII; V; I; IX; II; IV; III; VI; VIII
- B. I; IV; VIII; V; II; VI; VII; IX; III
- C. III; IV; V; IX; VIII; I; VI; VII; II
- D. III; II; VII; IV; VIII; VI; I; IX; V
- E. I; II; VII; VIII; IV; V; III; IX; VI

07. Um cão da raça Shih-tzu, macho, 4 anos, foi encaminhado à clínica apresentando disúria há dois dias, apatia e distensão abdominal. Ao exame físico observou-se obstrução uretral, desidratação e bradicardia. Esses sinais são característicos de qual alteração metabólica associada à obstrução uretral?

- a. Hipocalemia
- b. Hipercalemia
- c. Alcalose metabólica
- d. Hipoglicemia
- e. Acidose metabólica

08. Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) às seguintes assertivas sobre afecções do sistema neurológico depois escolha uma das alternativas:

- a. () Nem toda crise epilética é convulsiva.
- b. () Crises agrupadas “cluster” devem ser tratadas como urgência/emergência.
- c. () Nas doenças do sistema nervoso periférico, a consciência está sempre presente.
- d. () O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal.
- e. () O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, raízes nervosas, junções neuromusculares e músculos.
- f. () A posição plantígrada em gatos pode estar associada à polineuropatia diabética.
- g. () A ataxia pode ser dos tipos proprioceptiva, vestibular ou cerebelar.
- h. () Paresia não é sinônimo de plegia.

09. Síndrome metabólica sistêmica, grave e complexa, caracterizada por insuficiência renal aguda, mioglobulinúria, acidose metabólica, produção acentuada de radicais livres e hipercalemia. Qual a provável causa desta síndrome?

- a. Choque neurogênico
- b. Corticoterapia crônica
- c. Isquemia e reperfusão
- d. Choque volêmico
- e. Envenenamento

10. Uma das maiores casuísticas no atendimento dos pacientes na clínica cirúrgica são os animais com neoplasmas mamários. Avalie as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O tamanho do neoplasma mamário está correlacionado à sobrevida do animal.
 - II. A presença de células tumorais nos linfonodos axilares e inguinais é fator essencial na definição do prognóstico; por isso, em uma mastectomia, os linfonodos regionais devem sempre ser removidos para análise histopatológica.
 - III. O sistema de estadiamento tumoral TNM tem valores similares, tanto para cadelas como para gatas.
 - IV. Em gatas e cadelas, a avaliação imunohistoquímica dos indicadores Ki-67, COX-2, receptor de estrógeno e de progesterona indicam o prognóstico.
 - V. A mastectomia unilateral é o tratamento de eleição para carcinoma inflamatório.
 - VI. Em cadelas, as técnicas cirúrgicas para tratar os neoplasmas mamários incluem a lumpectomia, a mastectomia simples, a mastectomia regional, a mastectomia unilateral e a bilateral; associadas ou não à retirada dos linfonodos regionais ou à castração precoce. A raça, o tamanho, o peso, a idade ou o tempo de desenvolvimento do tumor não são relevantes para decidir a técnica recomendada. Ainda não existe consenso dos especialistas sobre a melhor técnica. O importante é unificar condutas para consolidar estudos futuros.
 - VII. Em gatas, a técnica de eleição é a mastectomia bilateral, que pode ser dividida em dois procedimentos.
 - VIII. A quimioterapia adjuvante não é indicada para todas cadelas e gatas com neoplasma mamários.
 - IX. A castração precoce, antes do primeiro cio, pode prevenir a incidência do tumor de mama em cadelas. Entretanto, predispõe à incidência de outras neoplasias, como osteossarcoma, linfoma e mastocitoma; além de distúrbios ortopédicos.
- a. Todas as assertivas estão corretas.
 - b. Todas as assertivas estão erradas.
 - c. **Afirmativas III e V estão erradas.**
 - d. As afirmativas II, IV e VII estão erradas.
 - e. As afirmativas I, II, V e VII g estão corretas.

- f. As afirmativas I, II, III, V e IX estão corretas.
- g. As afirmativas VI, VII, VIII, IX estão erradas.

11. Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) às seguintes afirmações sobre o Mastocitoma Cutâneo Canino, depois assinale a alternativa correta:

- a. () É o tumor maligno cutâneo mais comum em cães e gatos.
- b. () Não origina síndrome paraneoplásica.
- c. () A citologia deve ser usada apenas para o diagnóstico de triagem.
- d. () O consenso propõe que seja classificado de acordo com dois sistemas de classificação: o de Patnaik et al. (1984) e o de Kiupel et al. (2011).
- e. () Mastocitomas subcutâneos apresentam comportamento biológico mais agressivo.
- f. () Nos membros, as técnicas reconstrutivas (retalhos pediculados, bipediculados ou tubulares) são as melhores formas de correção cirúrgica, a fim de preservar o membro. Entretanto, a amputação do membro comprometido seria mais adequada.
- g. () As margens cirúrgicas devem ser amplas (3 cm nas laterais e uma fáscia profunda). É preferível ter uma ferida aberta pós-operatória (cicatrização secundária) do que ter margens comprometidas.
- h. () A quimioterapia metronômica e a eletroquimioterapia são opções alternativas à cirurgia em alguns casos.

8: a.(F) b.(F) c.(V) d.(V) e.(F) f.(V) g.(V) h.(V)


12. Correlacione as colunas de acordo com a sutura que deve ser preferencialmente utilizada em cada tecido/órgão. Escolha a sequência correta baseada na coluna da direita:

- a. Enterorrafia **3**
 - b. Esofagorrafia. **4**
 - c. Cistorrafia. **1**
 - d. Musculatura **2**
 - e. Subcutâneo. **5**
 - f. Mesentério. **7**
 - g. Blefarorrafia. **6**
-
- 1. Cushing e Lembert
 - 2. Sultan
 - 3. Simples interrompido
 - 4. Swift
 - 5. Zigue-zague
 - 6. Colchoeiro
 - 7. Simples contínuo

- A. 3, 4, 1, 2, 5, 7, 6
- B. 4, 3, 7, 5, 6, 1, 2
- C. 1, 5, 3, 4, 2, 6, 7
- D. 7, 2, 6, 4, 1, 3, 5
- E. 2, 5, 1, 3, 4, 6, 7

13. Associe as imagens abaixo à classificação da fratura.

- I. Fratura transversa em em terço médio de Radio e Ulna
- II. Fratura transversa em em terço médio de Tíbia e Fíbula
- III. Fratura transversa em terço proximal de Úmero
- IV. Fratura transversa em terço médio de Úmero
- V. Fratura oblíqua em terço médio de Fêmur
- VI. Fratura oblíqua em terço médio de Tíbia
- VII. Fratura de Salter Harris tipo IV em Úmero
- VIII. Fratura transversa em terço médio de Fêmur



- 1. c, f, b, a, h, d, e, g
- 2. f, g, h, c, e, d, a, b
- 3. d, f, a, h, b, g, c, e
- 4. g, d, c, h, b, f, a, e

14. Qual das seguintes raças braquicefálicas abaixo é mais predisposta a hipoplasia traqueal?

- a) Buldogue Inglês
- b) Shih tzu
- c) Pug
- d) Yorkshire
- e) Maltes

15. Qual das opções abaixo elenca as principais alterações encontradas em pacientes braquicefálicos?

- a) Estenose de narina, prolongamento de palato mole, paralisia laríngea grau I e desvio de septo nasal.
- b) Prolongamento de palato, colapso traqueal, paralisia laríngea e estenose de narina.
- c) Paralisia laríngea, hipoplasia traqueal, estenose de narina e prolongamento de palato mole.
- d) Estenose de narina, prolongamento de palato mole, hipoplasia traqueal e colapso laríngeo.
- e) Prolongamento de palato mole, hipoplasia traqueal e colapso laríngeo, seios nasais aberrantes e estenose de narina.

16. Em casos de anisocoria com suspeita de lesão em tronco simpático e possível síndrome de Horner, qual dos colírios abaixo pode ser utilizado como auxiliar na determinação de uma lesão pré-ganglionar ou pós ganglionar?

- a) Pilocarpina a 0,1%
- b) Atropina 0,5%
- c) Atropina 1%
- d) Tropicamida 1%
- e) **Fenilefrina 1%**

17. Em relação a síndrome ocular do Collie uma condição autossômica recessiva homozigota, as seguintes alterações podem estar presentes **exceto**:

- a) Coloboma do nervo óptico
- b) Estafiloma
- c) Descolamento de retina
- d) **Microftalmia**
- e) Hemorragia intraocular

18. O entrópio é definido como a inversão de parte ou de toda a margem palpebral. O contato constante dos pelos sobre a córnea leva a irritação da mesma e consequentemente a dor. São sinais clínicos comuns encontrados em pacientes com entrópio os seguintes sinais exceto:

- a) Epífora crônica
- b) Ceratite pigmentar
- c) **Uveíte severa**
- d) Secreção ocular mucóide a purulenta
- e) Blefaroespasma

19. Em casos de cães que apresentam Ectrópio e entrópio associado (*Diamond eye*), qual técnicas abaixo está indicada para correção:

- a) Robert - Jones modificada
- b) **Kuhnt-Zsyanowski modificada por Bedford**
- c) Hotz - Celsus
- d) Roberts – Jensen
- e) Morgan Pocket

20. Em casos de uroabdomen em cães a análise de líquido peritoneal revela:

- a) Potássio na proporção de 2:1 e creatinina 4:1
- b) **Potássio na proporção de 4:1 e creatinina 2:1**
- c) Magnésio proporção de 2:1 e potássio 1,4:1
- d) Cálcio na proporção de 2:1 e creatinina 1,4:1
- e) Potássio na proporção de 2:1 e creatinina 9:1

21. O uso indiscriminado de colírio de atropina por longos períodos em cães pode causar:

- a) **ceratoconjuntivite seca.**
- b) uveíte.
- c) catarata.
- d) retinopatia hipertensiva.
- e) hifema

22. Em relação as afecções do sistema urinário assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmativas abaixo e depois escolha a alternativa correta:

- a. (V) Urolitíase frequentemente envolve um ou mais locais do trato urinário, mas a bexiga é o mais comum local de ocorrência e retirada de cálculos.
- b. () Em cálculos de ureter a nefrectomia é sempre a melhor opção.
- c. (F) No fechamento da cistotomia o material de sutura deve ser aplicado sempre de forma perfurante total, uma vez que o material de sutura absorvível empregado no lúmen da bexiga, não funcionará como um estimulante para a formação de cálculos vesicais.
- d. (F) Os urólitos de estruvita e de fosfato de cálcio são os mais frequentes em cães e gatos.
- e. (V) A remoção incompleta de urólitos na cistotomia é comum e pode ocorrer em pelo menos 20% dos cães.

- a. V, F, F, F, V.
- b. V, V, F, F, V.
- c. F, V, F, V, V.
- d. V, V, V, F, F.
- e. V, F, V, F, V.

23. Um cão da raça Yorkshire foi atendido no Serviço de Oftalmologia Veterinária da UnB. À inspeção ocular verificou-se que o animal manifestava fotofobia e blefarospasmo em olho direito, demonstrando muito desconforto ocular. Ao exame clínico, o cão apresentou um valor do Teste lacrimal de Schirmer (TLS) de 0 e 3mm/min em olhos direito e esquerdo, respectivamente. A pressão intraocular aferida com um tonômetro de aplanção foi de 9mmHg em ambos os olhos, verificou-se conjuntiva hiperêmica e quemose. A córnea estava opaca e o exame da fluoresceína foi positivo no olho direito. A oftalmoscopia indireta não foi realizada porque o cão apresentava catarata em ambos os olhos. Sobre este animal, pode-se afirmar que (assinale verdadeiro (V) ou falso (F)), depois escolha a alternativa correta:

- a. () a pressão intraocular detectada é considerada baixa
- b. () o valor do TLS é indicativo de ceratoconjuntivite seca, ou olho seco
- c. () os meios oculares refringentes como lente e íris estavam comprometidos, dificultando a oftalmoscopia indireta.
- d. () o teste da fluoresceína positivo é indicativo de úlcera de córnea.
- e. () a fluoresceína cora estruturas hidrofílicas como o epitélio corneal.

- a. F, F, V, F, V.
- b. V, V, V, F, F.
- c. V, V, F, V, F.
- d. V, F, V, V, V.
- e. F, V, F, V, F.

24. Em relação a semiótica oftálmica assinale verdadeiro (V) ou falso (F) a cada afirmação abaixo, depois escolha a alternativa correta.

- a. (V) A Gonioscopia é utilizada para a avaliação do ângulo iridocorneano
- b. (F) O Teste de Jones positivo indica obstrução do ducto nasolacrimal.
- c. (F) O teste da osmolaridade da lágrima é utilizado para avaliação quantitativa da lágrima e analisa os íons encontrados na porção lipídica do filme lacrimal.
- d. (V) O teste lacrimal de Schirmer é utilizado para avaliação quantitativa da porção aquosa do filme lacrimal.
- e. (F) O teste de Seidel positivo é um ótimo indicativo quanto a presença de uveíte subclínica.

- a. V, V, V, F, F.
- b. V, F, F, V, F.

- c. F, F, F, V, F.
- d. V, V, F, F, F.
- e. F, V, F, V, F.

25. Em relação a catarata , assinale verdadeiro (V) ou falso (F) a cada afirmação abaixo, depois escolha uma alternativa.

- a. () as catarata provocam a perda visual , mas não trazem transtornos para o olho do animal, quando não operadas.
- b. () as cataratas só devem ser operadas no maior estágio de evolução, pois quanto mais avançadas se encontram mais fácil será sua redução pela facoemulsificação do núcleo.
- c. () os implantes das lente intraoculares após a facoemulsificação devem ser realizadas, uma vez que além de proporcionarem correção do erro refracional evitam a migração de células lentóides, que possuem poder de multiplicação e podem prejudicar a acuidade dos pacientes após a cirurgia.
- d. () as cirurgias de catarata quando operadas no momento adequado apresentam atualmente um índice baixo de complicação, todavia o glaucoma ainda é uma das principais complicações pós operatórias.
- e. () para a realização da cirurgia de catarata se faz necessária apenas a realização da ultrassonografia, sendo esse o exame principal para avaliação da funcionalidade da retina em pequenos animais.

- a. F, V, F, V, V.
- b. F, F, V, F, F.
- c. V, V, F, F, V.
- d. F, F, F, V, F.
- e. F, F, V, V, F.

14 - Para a seleção dos pacientes para a cirurgia de catarata alguns aspectos são importantes. Julque os itens como verdadeiros (V) ou falsos (F):

- () Custo
- () Avaliação quanto a uveíte previa deve ser sempre realizada.
- () Paciente não precisa ser cooperativo, sendo essa uma característica que não influencia a realização da cirurgia.
- () O paciente deve estar em boa saúde geral.
- () A avaliação eletroretinográfica é um exame importante no preparo do paciente para a cirurgia.

- a V V V V F
- b V V F F F
- c V F F V F
- d V V F V V
- e V V F F V

26. Em relação aos glaucomas, julgue s itens como verdadeiros (V) ou falsos (F):

- I. () os glaucomas são uma doença causadas apenas pelo aumento da pressão intraocular.
- II. () os glaucomas são classificados apenas em relação ao ângulo de drenagem.
- III. () os glaucomas são uma das principais causas de perda visual em cães.
- IV. () os glaucomas quando tratados de forma adequada promovem redução da pressão intraocular e cura do paciente a longo prazo.
- V. () como os glaucomas são uma doença de progressão lenta não são, portanto, considerado uma emergência oftálmica.


- a. F, F, V, F, F.
- b. F, F, F, V, V.
- c. F, V, V, F, F.

- d. F, F, V, V, F.
e. V, V, F, V, V.

27. Assinale qual alteração não está relacionada com o desenvolvimento do megacólon felino.

- a) Congênita.
b) Fraturas pélvicas.
c) Idiopática.
d) Neoplasias compressivas.
e) **Diarreia crônica.**

28. Observe a figura ao lado e assinale verdadeiro (V) ou falso (F):



- I. Um cão que apresente lesão na região A apresenta sinais clínicos como amaurose, alteração de estado mental e andar compulsivo.
II. Um animal com neoplasia na região C pode apresentar assimetria de face, atrofia de músculos mastigatórios e alteração de estado mental.
III. Animais afetados na região B apresentam sinais característicos, tais como ataxia com quedas para o lado afetado, inclinação de cabeça e crises epiléticas.
IV. Um cão em Shiff-Sherington apresenta opistótono e hiperextensão nos quatro membros com provável lesão na região A.
V. Opistótono, hiperextensão nos membros pélvicos são característicos de lesões na região B.

Assinale a alternativa correta:

- a. V, F, V, V, F
b. F, V, V, V, V
c. F, V, F, F, V
d. V, V, F, V, F
e. **V, V, F, F, F**

29. Um cão macho, da raça Pastor Alemão, oito anos de idade apresenta um quadro de regurgitação há cerca de 10 dias, tosse, dispneia, hiporexia e há três dias fraqueza muscular ao exercício. O exame clínico revelou prostração, dispneia restritiva, creptações pulmonares bilaterais e tono muscular reduzido com hiporreflexia. A radiografia torácica revelou megaesôfago e padrão alveolar. No hemograma observou-se leucocitose com desvio à esquerda. Marque a alternativa correta:

- a. O animal apresenta anomalia do anel vascular e pneumonia por aspiração, sendo necessária a ressecção cirúrgica do ligamento arterioso.
b. O animal apresenta persistência do ducto arterioso. O exame de ecodoppler pode confirmar a alteração e deve ser realizada a ligadura cirúrgica do ducto.
c. **O animal apresenta megaesôfago adquirido secundário, provavelmente por miastenia gravis. O diagnóstico baseia-se na detecção de anticorpos contra a acetilcolina e uso de anticolinesterásicos como tratamento.**
d. O paciente apresenta megaesôfago congênito que deve ser manejado com pró-cinéticos e alimentação em posição bipedal pelo restante de sua vida, com prognóstico reservado.
e. O animal apresenta megaesôfago idiopático. Deve ser tratado com pró-cinéticos, mantido com alimentação bipedal e tratada a pneumonia por aspiração.

30. Um cão com hiporreflexia em membros torácicos e hiperreflexia em membros pélvicos apresenta lesão em que região de medula espinhal? Cervical

- a. Cérvico-torácica
- b. Toraco-lombar
- c. Lombossacra
- d. Cervical alta
- e. Nenhuma das anteriores

31. Em relação à osteocondrose da cabeça do úmero é correto afirmar :

- a. Caracterizada-se pela presença de uma falha radilolúcida no aspecto caudal da cabeça umeral.
- b. Caracteriza-se pela presença de opacificação na região medular do úmero.
- c. Caracterizada-se por reação periosteal do tipo “sunburst”.
- d. Caracterizada-se por alteração do trabeculado ósseo medular do úmero
- e. Nenhuma das alternativas está correta.

32. Referente à dilatação-volvulo-gástrica (DVG) assinale a alternativa incorreta:

- a. A hiperplasia antral pode causar redução de esvaziamento gástrico.
- b. Animais de raças de porte médio são menos predispostos.
- c. A doença causa obstrução circulatória levando a aumento no tempo de preenchimento capilar, taquicardia e pulso fraco.
- d. A gastropexia evitará a recorrência, e para ser efetiva deve ser realizada na região de fundo gástrico.
- e. A esplenectomia não reduz a recorrência de DVG mas é necessária em casos de comprometimento vascular.

33. Numa clínica dão entrada quatro pacientes traumatizados. Qual você atenderia primeiro?

- a. Trauma por automóvel com fratura aberta de radio-ulna e proptose de globo ocular.
- b. Politraumatismo por queda, com ferida penetrante de tórax 5 cm maior a glote.
- c. Mordeduras no pescoço com cianose.
- d. Traumatismo abdominal com evisceração
- e. Queimadura em 50% da superfície corporal.

34. A conduta mais indicada em um paciente com pneumotórax hipertensivo é:

- a. Realizar de imediato uma toracocentese.
- b. Administrar oxigênio e esperar a evolução.
- c. Realizar de imediato radiografia de tórax para estabelecer o diagnóstico.
- d. Colocar fluido em grandes quantidades.
- e. Todas as anteriores.

35. Sobre as afirmações abaixo, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas e assinale a questão correta:

- a. () A gengivite caracteriza o estágio avançado e irreversível da doença periodontal.
- b. () A LROF (lesão de reabsorção odontoclástica felina) é por definição a reabsorção do cimento e/ou esmalte, e consequente exposição do canal do dente.
- c. () O melhor tratamento para os dentes com LROF é o tratamento do canal do dente.

- d. () A gengivite estomatite dos felinos não tem a etiologia claramente definida.
- e. () O tratamento mais eficaz para a gengivite estomatite dos felinos é o tratamento periodontal.
- a) F, V, V, V, V
b) F, V, F, V, F
c) F, V, F, V, V
d) V, V, F, V, F
e) F, V, V, V, F

36. Sobre luxação de patela, é **incorreto** afirmar que:

- a. Na luxação Grau IV, a patela está permanentemente luxada e não pode ser reposicionada manualmente.
- b. O diagnóstico é obtido por meio dos sinais clínicos e radiografia em duas projeções do membro afetado.
- c. A trocleoplastia recomendado para o tratamento para animais jovens com luxação de patela.
- d. A transposição da crista tibial é um procedimento geralmente utilizado para correção das luxações de grau III e IV.
- e. As luxações mediais são mais comuns que as luxações laterais em todas as raças de cães.

37. Marque somente a alternativa **correta** sobre as afirmações abaixo:

- I. A transposição do músculo obturador interno reduz a incidência de recidivas de hérnias perineais.
- II. As hérnias inguinais podem ser causadas por traumas e devem ser sempre diferenciadas de tumores mamários.
- III. A sutura em padrão com pontos simples separado é melhor opção para a herniorrafia diafragmática.
- a. Nenhuma correta
b. I e III corretas
c. Apenas I correta
d. I e II corretas
e. II e III corretas

38. São tipos de diérese, **exceto**:

- a) incisão
b) tracionamento
c) secção
d) divulsão
e) punção

39. Escolha a alternativa **CORRETA**:

- a. Cirurgia limpa é aquela onde realizamos a devida anti-sepsia no período pré-operatório.
- b. Cirurgia limpa contaminada é aquela que envolve os tratos gastrointestinal, urinário ou respiratório, mas onde não há derrame de conteúdo contaminado no campo operatório.
- c. Nas cirurgias contaminadas há presença de infecção no órgão ou tecido incisado.
- d. Nas cirurgias sujas, com presença de infecção, devemos utilizar fios cirúrgicos absorvíveis naturais (categute ou poliglactina 910), pois causam menor reação inflamatória.
- e. Cirurgias infectadas são aquelas onde a exposição do tecido tem mais de seis horas.

40. Com relação à ruptura do ligamento cruzado cranial assinale somente a alternativa **incorreta**:

- a. A ruptura do ligamento cruzado cranial causa claudicação e efusão articular e o teste de compressão tibial deve ser utilizado no diagnóstico clínico.
- a. A estabilização cirúrgica articular não impede a progressão da doença articular.
- b. A sutura fabelo-tibial é a forma mais utilizada de estabilização extra-articular indicada para cães com até 15 kg.
- c. No exame radiográfico simples é possível visualizar o deslocamento cranial do platô tibial e sinais de doença articular degenerativa nos casos crônicos.
- d. A administração de sulfato de condroitina por tempo prolongado promove regeneração articular e melhora acentuada dos sinais clínicos.